

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування препарату

ГЕПАТРОМБІН

(HEPARITHROMBIN)

Склад: 100 г гелю містять гепарину натрію 30 000 МО або 50 000 МО;

допоміжні речовини: алантоїн, декспантенол, олія *Pini pumilionis* та *Pini silvestris*, карбомер 940, L-ментол, динатрію едетат, триетанол амін, олія лимонна ефірна, сорбітол 70% рідкий, спирт ізопропіловий, софтиген 767, полісорбат 80, вода очищена.

Форма випуску. Гель.

Фармакотерапевтична група. Ангіопротектори. Гепарин або гепариноїди для місцевого застосування. Код АТС C05B A 53.

Фармакологічні властивості. *Фармакодинаміка.* Гепатромбін, гель – препарат високо дозованого антикоагулянта прямої дії гепарину для зовнішнього застосування. Виявляє місцеву антитромботичну, проти набрякову та протизапальну дію, стимулює процеси обміну речовин у тканинах, а також грануляцію та епітелізацію тканин, чинить антисептичну і анальгезуючу дію, покращує місцевий кровотік.

Фармакокінетика. При зовнішньому застосуванні гепарин не виявляє системної дії, відносно швидко проникає крізь епідерміс і накопи чується у верхніх шарах шкіри. Із тканин виділяється повільно, з періодом напів виведення близько 1 години.

Показання для застосування.

- Профілактика та лікування тромбозів, флебітів, тромбофлебітів, варикозного розширення вен, у т. ч. після операційних втручань;
- травми закриті, в т. ч. спортивні (розтягнення, гематоми, удари, контузії);
- тендовагініти;
- поліпшення загоєння після операційних ран (з метою запобігання утворюванню після операційних рубців).

Спосіб застосування та дози. Застосовується місцево. Дорослим стовпчик гелю (довжиною 5 см) наносять на ушкоджені ділянки шкіри 1-3 рази на добу. Гель втирають легкими масажними рухами знизу догори. Тривалість курсу лікування встановлюють індивідуально, залежно від стану хворого.

Побічна дія. В окремих випадках можливі алергічні реакції: еритема, шкірний висип, кропив'янка, ангіо невротичний набряк.

Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату; кровоточива виразка гомілки.

Передозування. У зв'язку з незначною системною абсорбцією передозування малоімовірне.

Особливості застосування. При тромбозі та тромбофлебії не можна застосовувати масаж. Гель не наносять на слизову оболонку, а також на відкриті рани. Досвід застосування в педіатрії відсутній.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Не встановлена.

Фармацевтичні характеристики.

Основні фізико-хімічні властивості: прозорий, безбарвний гель із запахом сосни і ізопропанолу;

Умови та термін зберігання. Зберігати при температурі 15-25°C у недоступному для дітей місці. Термін придатності - 3 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 40 г гелю у тубі, вкладеній у картонну упаковку.

Виробник. «Хемофарм» АД, Сербія.

Адреса. 26300, м. Вршац, Белградський шлях б/н,
тел./факс: 381/13/812345.